



# NURSING CARE FOR UTERINE BLEEDING PATIENTS

العناية التمريضية لمرضى  
النزيف الرحمي



2024

## الفهرس

3	قسم المهنة
4	رؤية ورسالة الرعاية التمريضية
5	النزيف
5	انواع النزيف
	العوامل المساعدة لحدوث النزيف ما بعد الولادة
6	علامات النزيف
	الرعاية التمريضية لحالات النزيف
7	المراجع

## قسم المهنة

"اقسم بالله العظيم

أن أخلص فى عملى و أتقى الله فى مهنتى و أحترم قوانينها و أنظمتها و أؤدى مهامى بكل كفاءة و إخلاص

و أن أستند فى أدائى على المعرفة المستمدة من علوم التمريض

و أبذل قصارى جهدى لرعاية كل من وكل إلى رعايتهم و أحفظ كرامتهم و أكتم سرهم و أدافع عن حقوقهم  
و حمايتهم من أى أذى

و ألا أخشى فى قول الحق لومة لائم و أوفر بيئة أمنة للمريض و الأسرة و المجتمع

و أن أستمر فى تطوير نفسى و أوقر من علمنى و أحترمه

و أتعاون مع زملائى فى المهنة على البر و التقوى

والله على ما أقول شهيد"

## رؤية الرعاية التمريضية بوحدة رعاية مرضى الداخلى

يتطلع أفراد هيئة التمريض بوحدة رعاية مرضى الداخلى للإرتقاء بمهنة التمريض وتقديم الرعاية التمريضية لمرضى الوحدة بفاعلية وأمان وجودة طبقاً للمعايير المصرية والقومية والعالمية.

## رسالة الرعاية التمريضية بوحدة رعاية مرضى الداخلى

يلتزم أفراد هيئة التمريض بوحدة رعاية مرضى الداخلى برفع المستوى الصحي للمرضى وتقديم أفضل رعاية تمريضية لهم بما يتماشى مع أهداف وإجراءات المستشفى وإدارة التمريض وكذلك تعمل على الإرتقاء بالمستوى العلمي والعملى لجميع أفراد هيئة التمريض بالوحدة وتغيير إتجاهاتهم نحو الإتجاهات الحديثة فى العلوم التمريضية والطبية .

## النزيف

\*هو فقدان كميته كبيرة من الدم اكثر من 500 سم دم بعد الولادة بحيث يؤثر على الحالة العامة للام

### انواع النزيف:

نزيف اولى : يحدث خلال 24 ساعه الاولى بعد الولادة

نزيف ثانوى : يحدث بعد 24 ساعه وحتى 42 ساعه بعد الولادة

### فقدان الدم ينقسم الى :::

فقدان دم بسيط: لا يؤثر على النبض والضغط للام

فقدان دم متوسط: يؤثر على النبض والضغط (ارتفاع فى النبض وانخفاض الضغط) ولا يؤثر على كمية الدم الواصل الى الكلى

فقدان دم شديد : يعمل على زيادة النبض وانخفاض الضغط ويحدث فقدان الوعى ويؤثر على اداء الكلى

### العوامل المساعدة لحدوث النزيف ما بعد الولادة "

اضرابات فى انقباضات الرحم

التمزقات المهبلية

ترك بعض اجزاء من المشيمة فى الرحم

حدوث عدوى فى الرحم

### علامات النزيف:

ارتخاء الرحم  
انخفاض درجة الوعي  
زيادة النبض وانخفاض الضغط  
برودة الاطراف  
شحوب الوجه  
قله البول

### الرعاية التمريضية لحالات النزيف::

مساج الرحم /15 دقيقة  
متابعه العلامات الحيوية  
متابعه عمل خريطة للسوائل  
عمل سونار لمعرفة سبب النزيف  
تعويض المفقود من الدم بالمحاليل  
عمل تحليل صورة دم كاملة لمتابعه التطورات

## المراجع

- National Institutes of Health (NIH): <https://www.nih.gov/>
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): <https://www.acog.org/>
- The American Society of Reproductive Medicine (ASRM): <https://www.asrm.org/>