



دليل رقم 13

العيوب الخلقية الشائعة لحديثي الولادة



2024/2025

الفهرس

1- إنسداد فتحة الأنف الخلفية
2- الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق
3- انسداد المريء، ووجود ناصور بين القصبة الهوائية والمريء
4- إنسداد فتحة بوابة المعدة
5- الفتق السري
6- خروج محتويات البطن مع الحبل السري
7- الفتق الإربي
8- إنسداد فتحة الشرج

العيوب الخلقية والحالات الجراحية الشائعة في حديثي الولادة

إنسداد فتحة الأنف الخلفية (Choanal atresia)

الأعراض:

- ظهور علامات صعوبة التنفس والزرقة بعد الولادة مباشرة، خصوصًا في حالات انسداد فتحة الأنف الخلفية الثنائية (على الناحيتين) وتقل حدة الزرقة مع بكاء الوليد.
- عرقلة عند محاولة إدخال قسطرة من الأنف إلى البلعوم .

الرعاية التمريضية:

- وضع ممر هوائي بالفم
- الفحص البدني الشامل للوليد لاستبعاد وجود أي عيوب خلقية ظاهرية أخرى.

الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق (Cleft lip / palate)

الأعراض:

- ظهور شق أو اثنان في الشفة العليا للوليد، قد يصاحبها وجود شق بسقف الحلق .
- صعوبة في المص والبلع أثناء الرضاعة .
- ظهور أعراض الإلتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى بشكل متكرر .

الرعاية التمريضية:

- استعمال حلمة خاصة عند إرضاع الوليد

انسداد المريء، ووجود ناصور بين القصبة الهوائية والمريء


[Esophageal atresia (EA) and Tracheoesophageal fistula (TEF)]

الأعراض:

- وجود رغاوي في لعاب الوليد نتيجة انسداد المريء .
- حدوث زرقة أثناء الرضاعة في حالة وجود ناصور بين القصبة الهوائية والمريء
- يتم التأكد من التشخيص عن طريق تركيب أنبوبة رايل، مع عمل أشعة عادية، وملاحظة التواء الأنبوبة أعلى المريء .

الرعاية التمريضية:

- وقف الرضاعة وإعطاء المحاليل، طبقا لتعليمات الطبيب .
- رفع رأس الوليد بزاوية ٣٠ درجة، لمنع حدوث الشرقة .
- التنشيط المستمر للعاب من المريء .



انسداد فتحة بوابة المعدة (Congenital hypertrophic pyloric stenosis - CHPS)

الأعراض:

- قيء متكرر ومنتفخ لا يحتوي على العصارة الصفراوية .
- جوع مستمر، نقص بالوزن، وظهور علامات الجفاف .

الرعاية التمريضية:

- وقف الرضاعة بالفم .
- إعطاء محاليل تعويضية لعلاج الجفاف، وتعويض نقص الأملاح بالدم، حسب تعليمات الطبيب .

الفتق السري (Umbilical hernia)

الأعراض:

بروز وانتفاخ سرّة الوليد أثناء البكاء

الرعاية التمريضية:

تجنّب العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط داخل بطن الوليد مثل البكاء، السعال، والإمساك) قدر الإمكان

خروج محتويات البطن مع الحبل السري (Exomphalos major - minor)

الأعراض:

خروج محتويات البطن (الأمعاء، الكبد، الطحال، والمثانة... إلخ) من سرّة الوليد مع الحبل السري بعد الولادة مباشرةً .

الرعاية التمريضية:

- وقف الرضاعة بالفم، وإعطاء المحاليل الوريدية، طبقاً لتعليمات الطبيب .
- تغطية مكان خروج محتويات البطن بشاشة معقمة ، ثم تغطى بكيس بلاستيك، للإقلال من معدل فقد الحرارة والسوائل.

الفتق الإربي (Inguinal hernia)

الأعراض:

ظهور انتفاخ أسفل البطن وأعلى الفخذ مع البكاء .

الرعاية التمريضية:

تجنّب العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط داخل البطن مثل البكاء، السعال، والإمساك بقدر الإمكان .

انسداد فتحة الشرج (Anal atresia)

الأعراض:

- وجود غشاء يغطي فتحة الشرج أو عدم وجود فتحة شرج .
- تأخر نزول العقي (أول براز يخرج من الوليد) بعد مرور ٤٨ ساعة من الولادة .

الرعاية التمريضية:

- القيام بعمل فحص للوليد، للكشف عن عدم وجود فتحة شرج في وقت مبكر .
- متابعة وتدوين تبرز الوليد خلال أول ٤٨ ساعة بعد الولادة .
- يمكن استخدام قسطرة لينة مطاطية للكشف عن وجود انسداد شرجي، إذا لم يتبرز الوليد بعد مرور ٤٨ ساعة من الولادة.
- في حالة وجود انسداد بفتحة الشرج، يتم وقف الرضاعة بالفم وإعطاء المحاليل، طبقاً لتعليمات الطبيب .

وجود فتحة مجرى البول أسفل العضو الذكري للوليد (Hypospadias)

الأعراض:

- ظهور فتحة البول أسفل العضو الذكري وليس في المقدمة .
- اتجاه تيار البول يكون إلى أسفل عند التبول .

الرعاية التمريضية:

- التنبيه على الأهل بضرورة تأجيل عملية الطهارة لحين عرض الوليد على طبيب جراحة الأطفال .