



دليل رقم 23

التسجيل التمريضي في ملفات حديثي الولادة



2024/2025

التدوين فى تذكرة الوليد والسجلات الطبية

أولاً: بيانات الدخول والتاريخ المرضى :

تدوين بيانات الوليد

- ✓ اسم الوليد، واسم الأب، واسم الأم
- ✓ نوع الوليد
- ✓ العمر الرحمي للوليد
- ✓ العنوان
- ✓ رقم تليفون الأهل

تدوين بيانات الولادة

- ✓ تاريخ الولادة، ومكان الولادة، ونوع الولادة
- ✓ خطوات الإفاقة ومقياس أبجار، إذا تمت الولادة داخل المستشفى
- ✓ اضافة البيانات الخاصة بالتطعيمات (اسم التطعيم -تاريخ التطعيم -ملاحظات)
- ✓ 2-تقييم الام باستخدام نموذج (cries)لتقييم الام لحديثى الولاده
- ✓ 3-تحديد نوع الحساسية ان وجدت (دوائية -غذائية -جلد-غير معروفة)
- ✓ 4-عيوب خلقية (الراس-الفم-الاطراف-الانف-العينين-الجسم -أخرى.....

تدوين بيانات الأم

- ✓ السن
- ✓ صلة القرابة بين الأب والأم
- ✓ إصابة الأم بالأمراض المزمنة(السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، الدرن...إلخ)
- ✓ إصابة الأم بالحمى أثناء الحمل
- ✓ حدوث انفجار مبكر لجيب المياه
- ✓ فصيلة الأم ومعامل ريزوس
- ✓ عدد مرات الحمل والولادة السابقين
- ✓ المتابعة الطبية أثناء فترة الحمل
- ✓ ولادة سابقة لأطفال مبتسرين أو مصابين بأي أمراض
- ✓ وجود أمراض وراثية بالعائلة

ثانياً: بيانات المتابعة اليومية للوليد :

العلامات الحيوية

- ✓ تدوين معدل التنفس، وجود انجذاب صدري، نثة، أو توقف بالتنفس كل ٣ ساعات .
- ✓ تدوين درجة الحرارة كل ٣ ساعات .
- ✓ تدوين معدل وانتظام ضربات القلب كل ٣ ساعات .
- ✓ تدوين قياسات ضغط الدم كل ٣ ساعات، إذا كانت حالة الوليد مستقرة، وكل ساعة، إذا كان الوليد على جهاز التنفس الصناعي.

✓ يتم قياس وتدوين العلامات الحيوية للوليد بعد العمليات الجراحية بمعدل كل ١٥ دقيقة لمدة ساعة، ثم كل ٣٠ دقيقة لمدة ساعة، ثم مرة كل ساعة حتى تستقر.

قياسات النمو

- ✓ تدوين وزن الوليد مرة يوميًا، ومرتين إذا كان الوليد أقل من ١٠٠٠ جم، وتسجيلها على منحنى الوزن .
- ✓ تدوين طول الوليد عند الدخول، ومرة كل أسبوع .
- ✓ تدوين محيط الرأس عند الدخول، ومرة أسبوعياً، أو يوميًا في حالات نزيف المخ، أو استسقاء الرأس، أو الاختناق الوليدي.
- ✓ تدوين محيط البطن كل مناوبة مع بدء التغذية عن طريق الجهاز الهضمي للمواليد ناقصي الوزن والنمو، أو في حالة وجود قسطرة سرية.

المتابعة اليومية

- ✓ تدوين معدل امتلاء الشعيرات الدموية بالثانية كل ٣ ساعات، مع العلامات الحيوية .
- ✓ تدوين درجة وعي الوليد كل ٣ ساعات، مع العلامات الحيوية .
- ✓ تدوين لون جلد الوليد كل ٣ ساعات، مع العلامات الحيوية .
- ✓ تدوين نتيجة قياس مستوى الجلوكوز بالدم مرة يوميًا لكل المواليد، أو حسب تعليمات الطبيب .
- ✓ تدوين طريقة الرضاعة، ونوع وكمية اللبن في حالة الرضاعة الصناعية .
- ✓ تدوين تاريخ تركيب الكانيولا، ويتم تغييرها كل ٧٢ ساعة .
- ✓ تدوين تاريخ إدخال أنبوبة التغذية، وتاريخ تغييرها (كل ٧٢ ساعة أو حسب الحاجة)
- ✓ يتم تدوين كمية السوائل الخارجة في صورة :
 - البول والبراز، بالإضافة إلى تدوين لون وقوام البراز.
 - القيء والشفط من المعدة، بالإضافة إلى تدوين اللون والقوام.
- ✓ تدوين المعامل المسحوبة يوميًا.
- ✓ تدوين تاريخ تركيب أجهزة المحاليل، ويجب التخلص من المحاليل التي سبق تجهيزها ولم تستخدم، بعد مرور ٢٤ ساعة من تحضيرها.

ثالثًا: حالات صعوبة التنفس :

الأكسجين

- ✓ تدوين وسيلة إعطاء الأكسجين، ومعدل تدفقه (لتر /دقيقة)
- ✓ تدوين مستوى تشبع الدم بالأكسجين .
- ✓ تدوين ميعاد تركيب مجس قياس التشبع، وتغييره كل ٤ ساعات .

التشفيط

- ✓ تدوين مكان التشفيط (من الفم، الأنف، والقصبه الهوائية) وكميته، ولونه .

المحاليل

- ✓ تدوين نوع التركيبة ومعدل السريان و الوقت والقائم بالتركيب ومكونات المحلول والادويه المضافه
- ✓ تدوين كمية السوائل الداخلة والخارجة كل ٣ ساعات، ويتم تجميعها كل ٢٤ ساعة في خريطه السوائل الداخله والخارجه

أجهزة التنفس باستخدام نظام الضغط الموجب المستمر على مجرى الهواء عن طريق الأنف والتنفس

الصناعي

- ✓ تدوين القراءات الخاصة بأجهزة السيباب، والتنفس الصناعي كل ساعة في السجل الخاص بها .
- ✓ تدوين مستوى الأنبوبة الحنجرية عند الشفة العليا للوليد .
- ✓ تدوين تغيير مكان الأنبوبة الحنجرية .

رابعًا: حالات الصفراء :

- ✓ تدوين عدد أجهزة العلاج الضوئي المستخدمة على الوليد .
- ✓ تدوين تغيير وضع الوليد، كل ساعتين .
- ✓ تدوين حالة الجلد، وظهور أي آثار جانبية للعلاج الضوئي .
- ✓ تدوين نتائج التحاليل المعملية .
- ✓ تدوين وقت تغيير الدم إذا تم عمله

خامسًا: حالات التشنجات :

يتم تصميم خريطة التشنجات (مكان التشنجات، وقت حدوثها، مدتها، الأعراض المصاحبة، التدخل التمريضي، واستخدام علاج طبقاً لتعليمات الطبيب)

سادسًا: حالات وليد الأم المصابة بالسكري :

تدوين نتيجة قياس مستوى الجلوكوز بالدم في خريطة كالاتي: مرتين في خلال ساعة، ثم مرتين في خلال ساعتين، ثم مرتين في خلال أربع ساعات، ثم مرة كل ٨ ساعات حتى يستقر مستوى الجلوكوز بالدم.

سابعًا: الأدوية :

يتم تدوين نوع الدواء، والجرعة، وطريقة إعطائه للوليد .